


PREGRESSA ANAFILASSI DA ALIMENTI

PIANO D'AZIONE PERSONALIZZATO - PESO INFERIORE AI 30 KG

Cognome e Nome _____ Nato il _____

Scuola e Classe/Sezione _____

Allergia a : _____



I SEGNI DI REAZIONE ALLERGICA INCLUDONO:

FOTO del bambino

SISTEMI:

SINTOMI:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Occhi 2. Naso 3. Bocca 4. Cute 5. Intestino 6. Respiro | <p>arrossamento e/o sfregamento degli occhi, lacrimazione</p> <p>sternuti ripetuti, prurito nasale, naso "che cola", sensazione acuta di naso tappato</p> <p>prurito & gonfiore delle labbra, lingua o bocca</p> <p>senso di calore, prurito al cuoio capelluto, orticaria, eruzione pruriginosa e/o gonfiore della faccia o di mani / piedi e/o della zona perigenitale</p> <p>nausea, crampi addominali, vomito e/o diarrea</p> <p>A. lievi accessi di tosse e respiro lievemente accelerato</p> <p><u>B. senso di chiusura e/o nodo alla gola e/o senso di soffocamento, raucedine acuta, importante difficoltà respiratoria, cianosi, arresto respiratorio</u></p> |
| <ol style="list-style-type: none"> 7. Circolo | <p><u>pallore intenso, debolezza, sonnolenza, PERDITA DI COSCIENZA</u></p> |

La severità dei sintomi può cambiare rapidamente evolvendo in situazioni pericolose per la vita!

COSA FARE:

se l'assunzione è CERTA oppure è SOSPETTATA in base alla comparsa di uno o più tra i sintomi elencati

• **chiamare SUBITO il 112 (e segnalare la sospetta ANAFILASSI)**

• se compaiono uno o più **SINTOMI** tra quelli elencati da 1 a 5 somministrare **SUBITO:**

Fenistil gocce

Bentelan compresse da 1 mg

_____ Kg _____ gocce per bocca _____ compressa/e per bocca

• **QUALORA COMPARISSERO I SINTOMI 6 A, somministrare oltre al Fenistil e al Bentelan:**

VENTOLIN o BRONCOVALEAS spray: 2 puff subito (con distanziatore), ripetibili ogni 20', altre 2 volte

• **QUALORA COMPARISSERO I SINTOMI 6 B e/o 7 somministrare:**

FAST JEKT 150 mcg o JEXT 150 mcg o CHENPEN 150 mcg adrenalina autoiniezzabile

POI avvisare i genitori ai seguenti numeri: 1) _____ 2) _____

**NON ESITARE NEL CONTATTARE IL 112 E NEL SOMMINISTRARE I FARMACI
ANCHE SE I GENITORI NON POSSONO ESSERE RINTRACCIATI**

NB: i farmaci non necessitano di conservazione in frigorifero, ma l'adrenalina autoiniezzabile va conservata al buio e a temperatura ambiente.

Data

Timbro e Firma del medico